

Reagent preparation containing magnetic particles in tablet form

Patent Number: ☐ US6274386
Publication date: 2001-08-14
Inventor(s): HARTTIG HERBERT (DE)
Applicant(s): ROCHE DIAGNOSTICS GMBH (US)
Requested Patent: ☐ EP0811694, A3, B1
Application Number: US19970870385 19970606
Priority Number(s): DE19961022885 19960607
IPC Classification: G01N33/553; G01N33/53; C12N11/08; A61K51/00
EC Classification: C12Q1/68A4, G01N33/543D4D, C12Q1/68B10
Equivalents: AU2370597, ☐ AU715803, CA2206760, ☐ DE19622885, DK811694T, IL121008,
☐ JP10062422

Abstract

Subject matter of the invention is a reagent preparation for binding components of a sample in the form of a tablet comprising a multitude of magnetic particles which are held together with the aid of excipients, and the use of this reagent preparation in analytical test

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 811 694 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
10.12.1997 Patentblatt 1997/50

(51) Int. Cl.⁶: **C12Q 1/68**, G01N 33/546,
G01N 33/552

(21) Anmeldenummer: **97109177.2**

(22) Anmeldetag: **06.06.1997**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LI NL SE

(30) Priorität: **07.06.1996 DE 19622885**

(71) Anmelder:
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH
68298 Mannheim (DE)

(72) Erfinder: **Harttig, Herbert, Dr.**
67122 Altrip (DE)

(54) **Reagenzzubereitung enthaltend magnetische Partikel in Form einer Tablette**

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Reagenzzubereitung zur Bindung von Inhaltsstoffen einer Probe in Form einer Tablette enthaltend eine Vielzahl von magnetischen Partikeln, die über Tablettierhilfsmittel zusammengehalten werden sowie Verwendung dieser Reagenzzubereitung in analytischen Tests.

EP 0 811 694 A2

Beschreibung

Gegenstand der Erfindung ist eine Reagenzzubereitung zur Bindung von Inhaltsstoffen einer Probe in Form einer Tablette, deren Verwendung zur Bindung oder Reinigung von Nukleinsäuren sowie ein Verfahren zur Suspension von magnetischen Partikeln in einer Probe und ein Verfahren zum Einbringen von magnetischen Partikeln in einer Probe.

Bei der Analytik von flüssigen Proben stellt sich oft das Problem, daß die zu analysierenden Bestandteile nur in sehr geringen Mengen vorhanden sind. Darüber hinaus befinden sich in der Probe eine Vielzahl nicht zu bestimmender Bestandteile, die die Bestimmungen ungenau werden lassen. Aus diesem Grund hat es sich als zweckmäßig erwiesen, die Analyten an eine feste Phase zu binden und die nicht zu bestimmenden Bestandteile mit der Flüssigkeit zu entfernen. Die isolierten Analyten können anschließend an der festen Phase nachgewiesen werden. Als feste Oberflächen wurden in jüngerer Zeit insbesondere die Innenwände von Reaktionsgefäßen (Tubes) eingesetzt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, der Probe in einem Reaktionsgefäß eine Kugel (Bead) zuzusetzen, die für die Bindung des Analyten entsprechend befähigt ist. Diese Perlen sind so groß, daß die Abtrennung der Flüssigkeiten von diesen Perlen durch einfache Pipettierung möglich ist. In jüngerer Zeit wurden nun jedoch auch kontinuierlich arbeitende Geräte entworfen, bei denen der Analyt an magnetische Partikel gebunden wird und der gebundene Analyt zusammen mit dem magnetischen Partikel über ein Magnetfeld von der sie umgebenden Flüssigkeit abgetrennt werden. Auch hier sind die magnetischen Partikel mit einer Oberfläche versehen, die die Bindung des Analyten erlaubt.

Diese magnetpartikelhaltigen Reagenzzubereitungen werden in Form von Suspensionen angeboten, welche der zu untersuchenden analytischen Flüssigkeit zupipettiert werden kann. Diese Pipettierschritte sind den üblichen Schwankungen bei Pipettierungen unterworfen. Darüber hinaus sind Fehler bei den Pipettierungen schwer erkennbar.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, die Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen und insbesondere Magnetpartikel in einer Form anzubieten, die eine einfache Dosierbarkeit erlaubt.

Gegenstand der Erfindung ist daher eine Reagenzzubereitung zur Bindung von Inhaltsstoffen einer Probe in Form einer Tablette enthaltend eine Vielzahl von magnetischen Partikeln mit einer Oberfläche, an welche die zu bindenden Inhaltsstoffe im wesentlichen vollständig binden können und Tablettierhilfsmittel. Ebenfalls Gegenstand der Erfindung sind Verwendungen dieser Reagenzzubereitungen und Verfahren zur Herstellung von magnetischen Suspensionen.

Unter Inhaltsstoffen einer Probe werden Materialien auf partikulärer oder molekularer Basis verstanden. Hierzu gehören insbesondere Zellen, z. B. Viren oder Bakterien, aber auch humane oder tierische isolierte Zellen, wie Leukozyten, sowie immunologisch aktive nieder- und hochmolekulare chemische Verbindungen, wie Haptene, Antigene, Antikörper und Nukleinsäuren. Besonders bevorzugt als Inhaltsstoffe sind Nukleinsäuren, z. B. DNA oder RNA.

Proben im Sinne der Erfindung sind beispielsweise klinische Proben, wie Blut, Serum, Mundspüllüssigkeit, Urin, Zerebrallüssigkeit, Sputum, Stuhl, Punkate und Knochenmarkproben. Die Probe kann auch aus dem Bereich der Umweltanalytik, der Lebensmittelanalytik oder der molekularbiologischen Forschung, z. B. aus Bakterienkulturen, Phagenlysaten und Produkten von Amplifikationsverfahren, z. B. PCR, stammen.

Eine Tablette im Sinne der Erfindung ist ein fester Formkörper, bevorzugt in Form einer flachen Scheibe oder in Form einer mehr oder weniger perfekten Kugel. Dazwischenliegende Ausführungsformen sind ebenfalls denkbar. Solche Tabletten sind in ihrer Form beispielsweise aus üblichen Arzneimittelzubereitungen bekannt. Bevorzugt hat die Tablette ein im voraus definiertes Gewicht, welches schwerer ist als 5 mg.

Unter einem magnetischen Partikel werden Partikel aus Materialien bezeichnet, die durch einen Magnet angezogen werden können, d. h. beispielsweise ferromagnetische oder superparamagnetische Materialien. Besonders bevorzugt im Sinne der Erfindung sind ferromagnetische Materialien, insbesondere wenn sie noch nicht vormagnetisiert wurden. Unter Vormagnetisierung ist in diesem Zusammenhang das Inkontaktbringen mit einem Magneten zu verstehen, wodurch die Remanenz erhöht wird. Besonders bevorzugt sind Magnetit (Fe_3O_4) oder Fe_2O_3 . Unter magnetischen Partikeln sollen jedoch auch Materialien verstanden werden, welche selbst (kleinere) magnetische Partikel enthalten. Hierzu gehört insbesondere das unter der Bezeichnung Iridin 600 (Merck, Darmstadt) käuflich erhältliche Pigment. Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Partikel, die eine durchschnittliche Korngröße von weniger als 100 μm haben. Besonders bevorzugt weisen sie eine durchschnittliche Korngröße von zwischen 10 und 60 μm auf. Bevorzugt ist die Korngrößenverteilung relativ homogen, insbesondere liegen nahezu keine Teilchen kleiner als 10 μm oder größer als 60 μm vor. Partikel, die diese Bedingung erfüllen, sind beispielsweise beschrieben in WO 90/06045.

Ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung ist die Tatsache, daß die magnetischen Partikel eine Oberfläche aufweisen, an welche die zu bindenden Inhaltsstoffe binden können. Diese Bindung kann entweder spezifisch oder relativ unspezifisch sein. Eine spezifische Bindung kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daß für die Bindung spezifische Wechselwirkungen, wie z. B. zwischen Antikörpern und Antigenen, Antikörpern und Haptenen oder komplementären Nukleinsäuren verwendet werden. Auch die Kombination solcher Wechselwirkungen ist möglich.

Eine bekannte Möglichkeit der Modifizierung einer Oberfläche ist beispielsweise der Überzug von Partikeln mit einer Schicht aus Streptavidin. Hierdurch läßt sich eine universell verwendbare Matrix erzeugen, an die über Konjugate von Biotin mit einem bestimmten Antikörper, einem bestimmten Hapten oder einer bestimmten Nukleinsäure spezifische Inhaltsstoffe aus der Probe gebunden werden können. Ausführungsformen sind dem Fachmann, insbesondere

auf dem Gebiet der Immunoassays, bekannt.

Unter einer relativ unspezifischen Bindung wird auch die Wechselwirkung zwischen einer glasartigen Oberfläche und Nukleinsäuren verstanden. So ist beispielsweise aus Proc. Natl. Acad. USA 76, 615 - 619 (1979) die Bindung von Nukleinsäuren aus Agarosegelen in Gegenwart von Natriumjodid in gemahlenem Flintglas bekannt. Magnetische Partikel, an deren Glasanteil Nukleinsäuren binden können, sind beispielsweise aus US-A-4,233,169 bekannt.

Im Sinne der Erfindung soll der zu bestimmende Inhaltsstoff im wesentlichen vollständig an die magnetischen Partikel binden können. Die Menge an hierfür erforderlichen magnetischen Partikeln kann ein Fachmann durch Variation der Menge an zugegebenen magnetischen Partikeln sehr leicht herausfinden. Im Sinne der Erfindung bedeutet eine im wesentlichen vollständige Bindung eine Bindung von mehr als 60 %, besonders bevorzugt mehr als 90 % der Probenmenge des zu bindenden Inhaltsstoffes.

Tablettierhilfsmittel dienen im wesentlichen dazu, die feste Form der Tablette zu erhalten, d. h. die magnetischen Partikel miteinander zu einer Tablette zu vereinigen. Bevorzugte Tablettierhilfsmittel sind im Sinne der Erfindung solche, die sich in der Probe, in der die Bindung stattfinden soll, schnell lösen können. Da es sich bei den flüssigen Proben bevorzugt um wässrige Lösungen handelt, können praktisch alle auch für Arzneimittel eingesetzten Tablettierhilfsmittel verwendet werden. Als besonders bevorzugt haben sich Polyethylenglykol (PEG) und Polyvinylpyrrolidon (PVP) erwiesen.

In DE-A-4406139 ist ein magnetisches Depotarzneimittel mit verbesserter Resorption der Wirkstoffe beschrieben. Die Tablette enthält einen scheibenförmigen Magnet und die Tablette wird zur Freisetzung des Wirkstoffes über mehrere Stunden hinweg beschrieben.

In International Journal of Pharmaceutics 119, 47 - 55 (1995) ist ebenfalls eine Tablette beschrieben, mit der eine verzögerte Freisetzung von Arzneimitteln erreicht wird.

In STP Pharmasciences Vol. 4, 425 - 430 (1994) ist die Herstellung ferrithaltiger magnetischer Tabletten und deren Verabreichung an Hunde beschrieben.

Die erfindungsgemäße Tablette kann darüber hinaus auch noch Stabilisierungsreagenzien enthalten. Hierbei hat es sich als bevorzugt erwiesen, Zucker zuzusetzen, z. B. D-Mannit, Trehalose oder Sorbit.

Erstaunlicherweise lassen sich magnetische Partikel, insbesondere solche mit einer Glasoberfläche, in Form einer Tablette ohne beobachtbare Hydrolyse des Glases und damit auch ohne beobachtbare Elution des Eisens aus den Magnetanteilen, lagern.

Bei den magnetischen Partikeln handelt es sich bevorzugt um Glasmagnetpigmente oder polymere Magnetbeads oder andere magnetische Partikel im Größenbereich von 0.1 µm bis 100 µm, beispielsweise solche, wie sie in DE 19520390 beschrieben sind.

Der Zubereitung können weiterhin Hilfsstoffe zugesetzt sein, die die Bindung der Inhaltsstoffe erleichtern. Hierzu gehören beispielsweise spezifitätsvermittelnde Stoffe, wie die oben erwähnten Konjugate, aber auch Stoffe, die die Eigenschaften der Probe dahingehend verändern, daß die zu bindenden Inhaltsstoffe leichter an die Oberfläche binden. Im Falle von Nukleinsäuren sind dies beispielsweise chaotrope Salze, wie z. B. Guanidiniumhydrochlorid, Natriumjodid, Natriumperchlorat oder ähnliche. Solche chaotropen Salze sind z. B. aus Anal. Biochem. 121, 382 - 387 (1982) und DE-A 37 34 442 bekannt.

Die Reagenzzubereitung kann außerdem noch Reagenzien enthalten, die die zu bindenden Inhaltsstoffe in eine Form überführen, sodaß sie überhaupt für eine Bindung zugänglich ist. Hierzu gehören beispielsweise Reagenzien, mit denen Kompartimente, z. B. Zellen, die Nukleinsäuren enthalten, lysiert werden können. Ein solches Reagenz ist beispielsweise Proteinase K oder die oben erwähnten chaotropen Salze.

Die Reagenzzubereitung kann auch pH-Puffersubstanzen und Reagenzien zur Lösung von Wechselwirkungen, wie z. B. Wasserstoffbrückenbindungen, Hydrophobenwechselwirkungen, ionischen Bindungen sowie Reagenzien zum spezifischen Nachweis von Substanzen oder Indikatoren, wie sie an sich als Komponenten eines immunologischen Assays bekannt sind, enthalten.

Für eine bevorzugte Tablette hat sich folgende Zusammensetzung als praktikabel erwiesen:

Bestandteil	bevorzugte Menge	besonders bevorzugte Menge
Tablettierhilfsmittel (z.B. PEG, PVP, Kalziumstearat)	2 - 10 %	3 %
Reagenzien	0 - 90 %	87 %
Magnetische Partikel	0.01 - 50 %	10 %

Selbstverständlich kann eine erfindungsgemäße Tablette weitere Bestandteile beinhalten, z. B. inerte Füllstoffe; die Gesamtmenge an Bestandteilen addiert sich zu 100 %. Die angegebenen Prozentzahlen sind Gewichtsprozent.

Die erfindungsgemäße Reagenzzubereitung in Form einer Tablette kann in Analogie zu Arzneimitteln in Tablettenform hergestellt werden. Hierzu werden die erforderlichen Komponenten miteinander innig vermischt und Aliquots in einer Tablettenpresse tablettiert. Dies geschieht insbesondere durch Einwirkung von Druck. Erfindungsgemäße Tabletten können jedoch auch durch Granulieren der Mischung der Komponenten erzeugt werden. Hierzu wird eine bestimmte Menge an trockener Mischung mit einer lösungsvermittelnden Flüssigkeit granuliert. Dem erhaltenen Granulat wird die Flüssigkeit anschließend wieder entzogen. Eine gleichmäßige Korngröße kann durch Sieben des Granulats erreicht werden.

Diese Herstellungsverfahren bewirken einen sehr niedrigen Variationskoeffizienten des Tablettengewichts und damit auch eine hohe Reproduzierbarkeit bei der Dosierung der Reagenzien im Anwendungsfall. Fehler bei der Dosierung können weniger oft stattfinden bzw. werden schneller bemerkt. Die erfindungsgemäßen Tabletten lassen sich sehr rasch auflösen, bevorzugt in weniger als 30 sec., besonders bevorzugt in zwischen 1 bis 10 sec., und die Magnetpartikel lassen sich einfach und schnell redispersieren. Die Tablettenform ist eine gut lagerfähige Form. Die Dosierung kann beispielsweise sogar manuell mit Hilfe eines Tablettenspenders erfolgen. Die bei Suspensionen auftretenden Verfälschungen durch Sedimentierung der Partikel sind nicht zu beobachten.

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der Reagenzzubereitung zur Bindung von Nukleinsäuren. Hierzu wird die Reagenzzubereitung der Probe zugegeben und solange inkubiert, bis sich 1.) die Tablette aufgelöst und 2.) die Nukleinsäuren im wesentlichen vollständig an die Oberfläche gebunden sind. Hierzu kann die Tablette mechanisch bewegt werden. Dies erhöht sowohl die Geschwindigkeit bei der Auflösung der Tablette als auch die Geschwindigkeit bei der Bindung der Inhaltsstoffe.

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der Reagenzzubereitung zur Reinigung von Nukleinsäuren. Hierzu werden die magnetischen Partikel mit den daran gebundenen Nukleinsäuren von der sie umgebenden Probenflüssigkeit entfernt. Dies geschieht zweckmäßigerweise durch Anlegen eines Magnetfeldes zum Zurückhalten der Magnetpartikel in einem Gefäß oder an einer bestimmten Stelle eines Apparates und anschließende Entfernung (z. B. durch Abpipettierung oder Verdrängung) der Probenflüssigkeit sowie gewünschtenfalls einer oder mehrerer Waschschriffe mit anderen Flüssigkeiten. Falls gewünscht können die gebundenen Nukleinsäuren durch Anlegung geeigneter Bedingungen wieder von den magnetischen Partikeln gelöst werden. Im Falle einer glasartigen Oberfläche sind diese bevorzugt Niedrigsalzbedingungen, d. h. der Salzgehalt der Elutionslösung liegt bei weniger als 100 mmol/l.

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Suspension von magnetischen Partikeln in einer Probe, enthaltend die Schritte Zugabe einer magnetische Partikel und lösliche Tablettierhilfsstoffe enthaltenden Tablette in die Probe und Bewegung der Tablette in der Probe, bevorzugt mit Hilfe eines beweglichen Magnetfeldes. Die Bewegung des Magnetfeldes kann z. B. dadurch erreicht werden, daß ein Magnet in der Nähe der Probe hin- und herbewegt wird, so daß die Tablette bzw. die magnetischen Partikel eine ständige Ortsveränderung mitmachen. Es ist jedoch auch möglich, das Gefäß, in welchem sich die Probe mit der Tablette bzw. den magnetischen Partikeln befindet, gegenüber dem Magneten zu bewegen.

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Einbringen von magnetischen Partikeln in eine Probe enthaltend die Schritte zur Verfügungstellung eines Spenders enthaltend eine Vielzahl von magnetpartikelhaltigen Tabletten und Betätigung des Spenders zum Entlassen einer Tablette aus dem Spender. Spender für die Zurverfügungstellung von Tabletten sind beispielsweise bei der Verabreichung von Medikamenten in Tablettenform gebräuchlich. Diese können beispielsweise in manueller Weise zur Dosierung im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden. Es ist hier nicht unbedingt erforderlich, daß nur eine Tablette pro Probe freigesetzt wird. Es ist auch möglich, eine bestimmte Anzahl von Tabletten, z. B. zwischen 2 und 10 Tabletten, abhängig von der beabsichtigten Verwendung in der Probe, zu entlassen.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern:

Beispiel 1

Herstellung des Glasmagnetpigments

Die Herstellung eines Sols ($\text{SiO}_2 \cdot \text{B}_2\text{O}_3 = 7:3$) wurde in einem 250 ml Rundkolben unter ständigem Rühren nach folgender Vorschrift durchgeführt:

86,6 ml Tetraethylorthosilicat
+ 7 ml wasserfreies unvergälltes Ethanol
+ 14,1 ml 0,15 M HCl

Es entsteht ein zweiphasiges Gemisch, welches bei Raumtemperatur solange gerührt wird, bis es einphasig wird. Danach erfolgt tropfenweise die Zugabe von 37,8 ml Trimethylborat. Anschließend wird das Sol 2 Stunden bei 50 °C gehalten. Danach erfolgt die Zugabe von 14,1 ml 0,15 M HCl

Nach Alterung wurde in 150 ml des Sols 22,5 g Iridin 600 (Black Mica, Merck, Darmstadt, BRD) eingerührt und

EP 0 811 694 A2

anschließend mit einem Sprühtrockner (Büchi 190, Mini Spray Dryer) beschichtet.

Das durch den Sprühtrockenprozeß erhaltene Pulver wurde anschließend einer Temperaturbehandlung unter Stickstoffatmosphäre unterzogen. Die Aufheizgeschwindigkeit betrug hierbei 1 K/min und die Haltezeit betrug 2 Stunden bei der Verdichtungstemperatur. Nach dem Verdichtungsprozeß wurde die Temperatur auf die Nachbehandlungstemperatur abgesenkt, die Stickstoffatmosphäre durch Luft ersetzt und das Pulver nach Ablauf der Nachbehandlung auf Raumtemperatur abgekühlt. Eventuell entstandene Agglomerate wurden mit einem 50 µm Sieb ausgesiebt.

Parameter	GMP 2
Alterung des Sols bei 30°C (h)	36
Pigmentanteil des Sols (g/100 ml)	15
Düsentemperatur (°C)	120
Luftstrom der Düse (%)	100
Luftdruck (bar)	6
Verdichtungstemperatur (°C)	534
O ₂ -Nachbehandlung (1 Stunde)	(300°C)

Beispiel 2

Herstellung der Tablette

Vormischung

43,62 g Glasmagnetpigment GMP 2 wurden mit 500 g Guanidiniumhydrochlorid gemischt und durch ein 0,2 mm Sieb auf einer Frewitt-Siebmaschine, Typ GLA-ORV, gesiebt. Die Ausbeute betrug 536,4 g, dies entspricht 98,7 %.

Granulieren

0,674 g Tris-HCl und 0,259 g Harnstoff wurden in 2,2 ml bidest. Wasser gelöst. Die Lösung wurde zusammen mit 266,4 g der Vormischung granuliert. Dabei wurden insgesamt 7 ml H₂O-bidest. zugegeben. Das erhaltene Granulat wurde im Vakuum bei Raumtemperatur über 24 Std. getrocknet und anschließend durch ein 0,6 mm Sieb gesiebt.

Tablettieren

246,98 g des Granulats wurden mit 7,41 g PEG 6000, sprüherstarrt, gemischt und auf einer Korsch PH106 Tablettenpresse mit einer Stempelgröße von 5 mm tablettiert. Die Ausbeute betrug 186,63 g oder 2902 Tabletten. Die Tabletten hatten ein Gewicht von 64,32 mg, eine Tablettenhärte von 1,5 kp, eine Auflösezeit in dest. Wasser bei Raumtemperatur von 6 sec., einen Abrieb von 0,8 % und eine Tablettenhöhe von 2,77 mm.

Die Tablettiermaschine und Stempel ließen sich gut reinigen, die Matrizen blieben blank, die Stempel waren nicht belegt. Die Masse lief etwas stockend, dies äußerte sich in einem Gewichts-VK von 4,65 % und kann durch technische Maßnahmen sehr leicht wesentlich verbessert werden.

Beispiel 3

Lagerung

10 Tabletten nach Beispiel 1 wurden in ein offenes Glasgefäß eingewogen. Die Lagerung erfolgte offen bei RT im Labor bei ca. 50 % rF. Die Gewichtsänderungen wurden über 4 Wochen verfolgt. Es ergab sich keine Gewichtsänderung.

Beispiel 4

a) PCR Probenvorbereitung aus humanen Vollblut mit magnetischen Glaspartikeln

5 Isolierung der Nukleinsäure

10 mg Glasmagnetpartikel GMP2 wurden je in Eppendorf Reaktionsgefäßen vorgelegt. Zu je 200 µl aufgetautem Vollblut wurden 40 µl Proteinase K (20 mg/ml, hergestellt aus Lyophilisat) pipettiert und sofort gemischt. Anschließend wurden 200 µl Bindepuffer (6 M Guanidin-HCl, 10 mM Tris-HCl, 10 mM Harnstoff, 30 % Triton X-100, pH 4,4) zugege-
 10 ben, gemischt und für 10 Minuten bei 70°C inkubiert. Nach Zugabe von 200 µl i-Propanol wurde für 10 Sekunden auf dem Vortex-Mischer gemischt, die Probe für 20 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert und abermals für 10 Sekunden wie vor gemischt. Die Magnetseparation erfolgte für wenigstens 30 Sekunden im Magnetpartikelseparator von Boehringer Mannheim (Id.-Nr. 1 641 794). Der Überstand wurde abgenommen und wie weiter unten beschrieben analysiert.

Die Magnetpartikel wurden mit jeweils 500 µl Wasch-Puffer (20 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 7,5 (25°C), 70 %
 15 Ethanol) durch 10 Sekunden mischen, 1 Minute Inkubation bei Raumtemperatur und 10 Sekunden mischen gewaschen und mit dem Magnetpartikelseparator an die Gefäßwand gezogen. Der Überstand wurde abgenommen und verworfen. Die Waschprozedur wurde wiederholt bis der Waschüberstand farblos war (insgesamt 5 x Waschen). Nun wurden die Nukleinsäuren 3 x mit jeweils 200 µl auf 70°C vorgewärmten Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5) durch 10 Sekunden mischen, 10 Minuten Inkubation bei Raumtemperatur und 10 Minuten mischen eluiert.

20

Aufarbeitung des Überstandes

Der Überstand nach der 1. Bindung an die magnetischen Glaspartikel wurde folgendermaßen auf Gehalt an Nukleinsäuren überprüft: Der Überstand wurde in ein Filter-Tube (Boehringer Mannheim, Id.-Nr. 1744003, z.B. enthalten in
 25 High Pure PCR Product Purification Kit) gegeben und für 1 Minute bei 8000 rpm in einer Eppendorf Tischzentrifuge zentrifugiert. Der Durchlauf wird verworfen und das Filter-Tube 2 x mit 500 µl Wasch-Puffer gewaschen (Zentrifugation wie vor). Das Filter-Tube wird kurz trocken zentrifugiert und dann mit 2 x 200 µl auf 70°C vorgewärmten 1 x Elutionspuffer durch erneute Zentrifugation eluiert.

30 Analyse der Eluate und des Probenüberstandes

50 µl der Eluate bzw. der über Filter-Tube aufgearbeiteten Überstände wurden mit 10 µl Proben-Puffer versetzt und davon 45 µl in einem 0,8 %igen Agarosegel elektrophoretisch bei 120 V für 90 Minuten aufgetrennt.

Verschiedene Verdünnungen der Eluate bzw. der aufgearbeiteten Überstände wurden bei 260 und 280 nm in
 35 einem Uvikon 710 (Kontron) spektroskopisch vermessen.

Zwei 5 µl Aliquots der Eluate wurden als Doppelbestimmung durch Expand™ Long Template PCR (Boehringer Mannheim, Id.-Nr. 1681834) mit spezifischen Primern für das menschliche tPA-Gen (erwartete Produktlänge 15 kb) überprüft.

40

Mix I	pro Ansatz	Mix II	pro Ansatz
dNTP, je 100 mM	1 µl	Expand™ Puffer, 10 x	5 µl
Primer 1, 200 ng/µl	1 µl	Expand™ Polymerase	0,75 µl
Primer 2, 225 ng/µl	1 µl	H ₂ O, bidest.	19,25 µl
H ₂ O, bidest	17 µl		
	<u>20 µl</u>		<u>25 µl</u>

50

Mix I wird in ein dünnwandiges PCR-Tube vorgelegt mit 5 µl Eluat versetzt und Mix II zugegeben. Der Ansatz wird kurz gemischt und mit 30 µl Mineralöl überschichtet. Die Ansätze werden in einem Perkin-Elmer Thermocycler 9600 mit folgendem Programm amplifiziert:

55

5	2 Minuten	92°C	
	10 Sekunden	92°C	
	30 Sekunden	65°C	10 Zyklen
	12 Minuten	68°C	
	10 Sekunden	92°C	
10	30 Sekunden	65°C	20 Zyklen
	12 Minuten + 20 Sekunden pro Zyklus	68°C	
	7 Minuten	68°C	
15	anschließend	7°C	

Die 50 µl PCR Ansätze wurden mit 10 µl Proben-Puffer versetzt und davon 45 µl in einem 0,8 %igen Agarosegel elektrophoretisch bei 120 V für 90 Minuten aufgetrennt.

b) Verwendung der erfindungsgemäß tablettierte Pigmente aus Beispiel 2

2 Tabletten nach Beispiel 2 wurden in ein Eppendorf Reaktionsgefäß vorgelegt, 40 ml Proteinase K (20mg/ml) und 200 µl aufgetautes Vollblut wie in Beispiel 4a) zugegeben und sofort 10 sec auf einem Vortex Mischer gemischt. 200 µl 30% Triton X-100 wurden zugegeben und 10 min mit dem Vortex Mischer gemischt. Die weitere Behandlung erfolgte analog zu Beispiel 4a).

c) Vergleich

Sowohl hinsichtlich der Ausbeute von DNA im ersten Elutionsschritt als auch der Amplifizierbarkeit gab es im Rahmen der üblichen Schwankungen identische Ergebnisse für 4a) und 4b).

Patentansprüche

1. Reagenzzubereitung zur Bindung von Inhaltsstoffen einer Probe in Form einer Tablette enthaltend
 - eine Vielzahl von magnetischen Partikeln mit einer Oberfläche, an welche die zu bindenden Inhaltsstoffe im wesentlichen vollständig binden können und
 - Tablettierhilfsmittel.
2. Reagenzzubereitung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie darüber hinaus Hilfsstoffe enthält, die die Bindung der Inhaltsstoffe erleichtern.
3. Reagenzzubereitung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetischen Partikel weniger als 100 µm im Durchmesser betragen.
4. Reagenzzubereitung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetischen Partikel eine glasartige Oberfläche aufweisen.
5. Reagenzzubereitung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Tablette schwerer ist als 5 mg.
6. Reagenzzubereitung gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Hilfsstoff ein chaotropes Salz ist.
7. Verwendung einer Reagenzzubereitung gemäß einem der vorangehenden Ansprüche zur Bindung von Nukleinsäuren.
8. Verwendung einer Reagenzzubereitung gemäß einem der vorangehenden Ansprüche zur Reinigung von Nukleinsäuren.

EP 0 811 694 A2

9. Verfahren zur Suspension von magnetischen Partikeln in einer Probe enthaltend die Schritte

- Einbringen einer magnetische Partikel und lösliche Tablettierhilfsstoffe enthaltenden Tablette in die Probe und
- 5 - Bewegung der Tablette in der Probe.

10. Verfahren zum Einbringen von magnetischen Partikeln in eine Probe enthaltend die Schritte

- 10 - Zurverfügungstellung eines Spenders enthaltend eine Vielzahl von magnetpartikelhaltigen Tabletten und
- Betätigung des Spenders zum Entlassen einer Tablette aus dem Spender.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 811 694 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
13.01.1999 Patentblatt 1999/02

(51) Int. Cl.⁶: **C12Q 1/68**, G01N 33/546,
G01N 33/552

(43) Veröffentlichungstag A2:
10.12.1997 Patentblatt 1997/50

(21) Anmeldenummer: **97109177.2**

(22) Anmeldetag: **06.06.1997**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LI NL SE

(71) Anmelder:
BOEHRINGER MANNHEIM GMBH
68298 Mannheim (DE)

(30) Priorität: **07.06.1996 DE 19622885**

(72) Erfinder: **Harttig, Herbert, Dr.**
67122 Altrip (DE)

(54) **Reagenzzubereitung enthaltend magnetische Partikel in Form einer Tablette**

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Reagenzzubereitung zur Bindung von Inhaltsstoffen einer Probe in Form einer Tablette enthaltend eine Vielzahl von magnetischen Partikeln, die über Tablettierhilfsmittel zusammengehalten werden sowie Verwendung dieser Reagenzzubereitung in analytischen Tests.

EP 0 811 694 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 10 9177

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 4 115 534 A (ITHAKISSIOS DIONYSSIS S) 19. September 1978 * Zusammenfassung; Beispiel 1 * * Spalte 7, Zeile 62 - Spalte 8, Zeile 8 * * Spalte 8, Zeile 45 - Zeile 60 *	1-3,9	C12Q1/68 G01N33/546 G01N33/552
Y	---	4,5,7,8,10	
D,Y	MARKO M A ET AL: "A PROCEDURE FOR THE LARGE-SCALE ISOLATION OF HIGHLY PURIFIED PLASMID DNA USING ALKALINE EXTRACTION AND BINDING TO GLASS POWDER" ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, Bd. 121, Nr. 2, April 1982, Seiten 382-387, XP000602405 * Zusammenfassung *	4,7,8	
D,Y	FUJIMORI ET AL.: "Preparation of a magnetically-responsive tablet and confirmation of its gastric residence in beagle dogs" S.T.P. PHARMA SCIENCES, Bd. 4, Nr. 6, 1994, Seiten 425-430, XP002084676 * Zusammenfassung * * Seite 426, linke Spalte, Absatz 1 *	5	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C12Q G01N
Y	US 3 981 776 A (SAXHOLM ROLF) 21. September 1976 * Spalte 3, Zeile 17 - Zeile 18 *	10	
X	US 4 169 804 A (YAPPEL ANTHONY F JR) 2. Oktober 1979 * Spalte 7, Zeile 3 - Zeile 4 * * Spalte 7, Zeile 15 - Zeile 17 * * Spalte 7, Zeile 27 - Zeile 50 *	1,2,9	

	-/--		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 17. November 1998	Prüfer Ceder, O
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 10 9177

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,A	VOGELSTEIN B ET AL: "PREPARATIVE AND ANALYTICAL PURIFICATION OF DNA FROM AGAROSE" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE USA, Bd. 76, Nr. 2, Februar 1979, Seiten 615-619, XP000609019 * Zusammenfassung *	4,7,8	
D,A	WO 90 06045 A (HOLMES MICHAEL JOHN ;DYNAL AS (NO)) 14. Juni 1990	3,7,8 /	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 17. November 1998	Prüfer Ceder, O
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)